

COLDISEPT NANO SILVER

Gerklės purškalas

Medicinos priemonė purškalo forma yra naudojama bakterijų ir virusų infekcijos sukkelto gerklės uždegimo gydymui papildyti.

COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalas ant gerklės gleivinės sukuria apsauginį sluoksnį, kuris apsaugo nuo fizinių, cheminių ir biologinių veiksnių.

COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalas padeda pašalinti nuolatinį nemalonų pojūtį, nes drėkina išdžiūvusią gerklės gleivinę ir todėl reikšmingai palengvina uždegimo simptomus, tokius kaip skausmas ir deginimas. Priemonė sudaro gelio sluoksnį, kuris burnos ir gerklės gleivinę apsaugo nuo bakterijų ir virusų.

Priemonės sudėtyje esantis vandeninis natrio, kalio, kalcio ir magnio mineralinių druskų tirpalas išvalo gerklę, sumažina gerklės ir nosies gleivinės paburkimą bei padeda palaikyti sudirgintos gleivinės regeneraciją.

Priemonėje yra sidabro nanodalelių, kurios riboja bakterijų augimą. Pipirmėčių aliejus padeda išvalyti nosies takus, palengvina kosulį ir sumažina kvėpavimo diskomfortą.

SUDEDAMOSIOS DALYS

šgrynintas vanduo, sidabro nanokoloidinis tirpalas, (karagenų) ekstraktas, sorbitolis, glicerolis, mineralinės druskos (kalio divandenilio fosfatas, kalio chloridas, natrio chloridas, kalcio chlorido heksahidratas, magnio chlorido heksahidratas), pipirmėčių aliejus, natrio benzoatas, citrinos rūgštis

INDIKACIJOS

COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalas veiksmingai papildo gydymą esant:

- burnos ir gerklės gleivinės uždegimui;
- tonzilių uždegimui;
- būklei po tonzilių pašalinimo.

ŠALUTINIS POVEIKIS

Šalutinis COLDISEPT nanoSILVER gerklės purškalo poveikis nėra žinomas, tačiau negalima paneigti alergijos simptomų atsiradimo galimybes, ypač jautriems asmenims. Jei pasireiškia alerginė reakcija, nutraukite priemonės naudojimą.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nenaudokite priemonės, jei esate alergiški bet kokiai sudedamajai daliai.

Nenaudokite priemonės, jei esate alergiški metaliniam sidabru.

Saugokitės nuo atsitiktinio sąlyčio su akimis.

Jei pasireiškia bet kokių nerimą keliančių simptomų, priemonės naudojimą nutraukite.

Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui!

Nėščioms moterims ir jaunesniems kaip 6 metų vaikams priemonę galima naudoti tik prižiūrint medikui.

Priemonę galima naudoti ilgą laikotarpį nekeliant pripratimo, šalutinio poveikio ar komplikacijų rizikai. Apie bet kokią su priemone susijusį sunkų incidentą būtina pranešti gamintojui ir šalies, kurioje naudotojas gyvena, kompetentingai institucijai.

Kompetentinga nacionalinė sveikatos priežiūros institucija: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS

Naudokite priemonę 3-4 kartus per dieną, atsižvelgdami į individualų poreikį.

Prieš pirmąjį naudojimą kelis kartus nuspauskite dozatorių.

Aplikatorių įkiškite kiek įmanoma giliau į burną ir nukreipkite į gerklę.

Įpurkškite 3-4 dozes (paspauskite aplikatoriaus pompą).

LAIKYMAS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

20 ml pakuotė

Pagaminta ES pagal: Alpen Pharma AG, Bern, Šveicarija užsakymą